

Chirurgie intime

> Consultation chirurgie intime

La chirurgie intime est effectuée par un gynécologue en clinique privée à Genève, les différentes interventions possibles sont les suivantes :

- Ablation de l'utérus par hystérectomie par voie vaginale ou abdominale
- Chirurgie de l'incontinence urinaire par pose de bandelettes synthétiques intra-vaginales
- **Laparoscopie** qui permet des interventions sans ouverture de la paroi abdominale à but diagnostique ou opératoire (comme par exemple grossesse extra-utérine, ligature de trompes, kyste ovarien)
- Conisation, amputation d'une partie du col pour dysplasie établie après biopsie
- Le curetage utérin avisé diagnostique et thérapeutique avec prélèvement de tissu interne de l'utérus
- [L'interruption volontaire de grossesse](#) par méthode chirurgicale, par aspiration

L'hystéroscopie : Explore l'intérieur de l'utérus par endoscopie avec une caméra : Utile en cas de :

- Pathologies intra-utérines
- Polypes, [fibromes](#)
- Saignements inexplicables
- [Infertilité](#)
- Et parfois elle est complétée par des gestes opératoires intra-utérins.
- La stérilisation tubaire est effectuée par [laparoscopie](#).

> Blanchissement vulvaire

Au fil du temps, votre corps peut subir de nombreux changements. L'une est la décoloration de votre intimité. C'est courant, **mais il existe des moyens de le traiter**. Notre [équipe de gynécologue](#) à Genève peut vous aider à rétablir la coloration de votre région vaginale afin que vous puissiez vous sentir plus en confiance dans votre peau. Pour en savoir plus sur ce service, appelez-nous ou prenez [rendez-vous en ligne](#).

> L'augmentation du volume du point G

La procédure est réalisée soit sous **anesthésie locale**, soit sous sédation, selon le souhait de la patiente. L'augmentation du point G est obtenue soit par l'injection de tissu adipeux autologue ou d'acide hyaluronique en tant que charge. L'objectif est d'augmenter le point G en doublant sa taille initiale afin de réaliser une stimulation suffisamment intensifiée pendant les rapports sexuels.

> Le rajeunissement au laser pour traitement vaginal

Les femmes âgées ont généralement des **problèmes gynécologiques** fortement liés aux changements hormonaux, par ex. le vagin devient sombre, un vagin desserré ou sec provoquant des douleurs lors des rapports sexuels et une incontinence urinaire, en particulier en toussant ou éternuant. Ces problèmes affectent en grande partie la vie quotidienne et les activités de tous les jours, entraînant une dégradation de la qualité de vie. Le «traitement au laser vaginal» est une technologie de pointe utilisée dans le rajeunissement pour traiter les problèmes gynécologiques associés aux symptômes de la ménopause / post-ménopause.

Un traitement avancé au [laser vaginal utilisant un laser CO2 fractionné](#) avec une sonde à 360 degrés couvrant la totalité de la paroi vaginale contribue à améliorer de manière significative la santé vaginale. Pendant la procédure, une sonde vaginale est insérée dans le vagin. Ça utilise l'énergie du laser pour **stimuler les cellules de fibroblastes**, cellules biologiques qui synthétisent le collagène vaginal, afin de travailler plus efficacement dans le processus de remodelage du collagène sans ablation invasive tout en augmentant l'hydratation et en resserrant le tissu vaginal. Cela améliore les symptômes d'incontinence urinaire, en particulier pendant les éternuements ou la toux. En outre, le scanner avec une capacité de balayage à 360 degrés peut stimuler davantage la production de collagène et le processus d'exfoliation de la peau. En conséquence, la peau vaginale sera visiblement plus lumineuse et plus lisse dans la semaine qui suit l'intervention.

> Reconstruction de l'hymen

L'hymen est une épaisse couche de tissu membraneux qui entoure l'orifice vaginal à partir de l'orifice urétral et permet ainsi la fuite du sang menstruel.

La réparation de l'hymen est une opération simple qui consiste à exciser les bords déchirés avant de les **coudre avec des sutures solubles** fines. Elle est souvent réalisée sous anesthésie locale avec sédation, mais peut également être réalisée sous anesthésie générale. Cette chirurgie n'est pas particulièrement invasive. L'hymen a en fait une couche secondaire qui sera semée pour couvrir la peau déchirée. En se greffant une fois de plus, l'hymen apparaîtra intact. Ou si, pour une raison quelconque, cela n'est pas possible, un nouvel **hymen** peut être créé à partir de la lèvre du vagin.

> Resserrement du vagin post-accouchement

La **vaginoplastie** (également appelée colporrhaphie postérieure) est une procédure conçue pour resserrer le vagin. Une alternative est le

resserrement vaginal non invasif par chauffage des tissus avec des ondes de radiofréquence ou au laser.

Après l'accouchement, les femmes peuvent se plaindre de laxisme vaginal, résultant de l'étirement des tissus et de la séparation des muscles, parfois jusqu'à la chute du tampon. Ce manque de tonus peut contribuer à un dysfonctionnement sexuel. Une vaginoplastie rassemble les muscles séparés et élimine le surplus de peau de la muqueuse situé à l'arrière du vagin. La peau externe peut également être retirée pour un aspect plus esthétique.